

PREVENZIONE DELLA PEDICULOSI IN COMUNITÀ SCOLASTICA

In riferimento alle seguenti indicazioni del Ministero della Sanità **relative alla pediculosi**

- **circolare n. 4 /1998** *"Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica"*
- **nota del 09.09.2013** sulla *"Pediculosi: Riammissione a scuola"*

e la **nota dell'ASP Lazio del 02.12.2005** *"Misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole.*

Per un'accurata igiene dei vostri figli, vi sollecitiamo a controllarne la testa almeno due volte alla settimana. Nel caso in cui trovaste i parassiti e/o le uova, o i vostri figli venissero sospesi dalla scuola perchè affetti da pediculosi del capo, iniziare subito il trattamento specifico antiparassitario con le seguenti modalità:

- **LAVARE** i capelli con uno shampoo antiparassitario
- **LASCIARE** lo shampoo sui capelli per almeno cinque minuti
- **SCIACQUARE** accuratamente
- **ASCIUGARE** i capelli
- **PETTINARE** con pettine a denti fitti
- **STACCARE** le lendini rimaste attaccate al capello
- **CONTROLLARE** accuratamente che non vi siano lendini (utilizzando anche una lente di ingrandimento)
- **EFFETTUARE** un'accurata ispezione della testa di tutti i familiari e lo stesso trattamento dello studente infestato
- **IMMERGERE** con lo shampoo antiparassitario spazzole e pettini utilizzati per il controllo in una bacinella con shampoo antiparassitario
- **ESTENDERE** il trattamento ai componenti del nucleo familiare per debellare l'infestazione radicalmente

RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO UNA SETTIMANA